Стеатоз печени

Жировая дистрофия печени: повышенное содержание жира (преимущественно триглицеридов) в печени, превышающее 5 % веса печени.

Возникновение

Жировая дистрофия печени является реакцией организма на различные нарушения обмена веществ, таких как ожирение (адипозитас), нарушения обмена жиров (гиперлипопротеинемия), сахарный диабет, беременность или чрезмерное употребление алкоголя.
В редких случаях вполне может развиться цирроз печени.

Профилактика

Умеренное употребление алкоголя, нежирная пища, распознавание и лечение основного заболевания.

Симптомы

Часто нет никаких особых симптомов (проявлений), вероятны лёгкая утомляемость, слабость, рвота, метеоризм (повышенное газообразование в кишечнике).

Диагностика

Лабораторные обследования:

- анализы функции печени (трансаминазы);
- анализы крови (триглицериды, холестерин);

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.
Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de
© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH

- ультразвуковое обследование (сонография, возможно, пункция печени).

Терапия

Лечение основного заболевания, умеренное употребление алкоголя, здоровое питание (минимум жиров и сахара). Медикаментозное лечение: зачастую безрезультатно.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.
Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de
© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH