Рак груди

Онкологическое заболевание молочной железы, возникающее в различных сегментах тканей (например, дольках железы, проходах железы).

На ранних стадиях рак груди локально ограничен. Постепенно, со временем, опухоль может прорастать в кровеносные и лимфатические сосуды, а также давать метастазы (очаги опухоли в других органах).

Возникновение

Наряду с генетически обусловленным и способным с большой вероятностью передаваться по наследству (мутация протоонкогена BRCA-1/-2) раком, встречается спорадическая форма рака, а также множественные случаи заболевания в одной семье без очевидной генетической предрасположенности. К факторам риска относятся: избыточный вес, курение , злоупотребление алкоголем, иногда- многолетний приём гормонов, сахарный диабет, недостаток физической активности, поздняя первая беременность.

Профилактика

Различные факторы образа жизни: стремление к нормализации веса, отказ от частого употребления никотина и алкоголя в больших количествах, регулярные спортивные нагрузки, сбалансированное питание. Пациентки группы риска (семейная предрасположенность) могут при необходимости участвовать в программах – наблюдениях, превентивно принимая лекарственные препараты.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.
Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de
© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH

Симптомы

Нащупываемые узлы и изменения кожи (дефект типа «лимонная корочка», втяжения) относятся скорее к поздним проявлениям . По — настоящему раннее распознавание возможно только с помощью маммографии или ультразвукового исследования (УЗИ) с высокой разрешающей способностью. В определённых случаях может применяться магнитно-ядерно-резонансная томография (МРТ).

Диагностика

Маммография (- скрининг), ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-ядерно-резонансная томография (МРТ). Так называемые опухолевые маркеры для определения раковых клеток для диагностики в данном случае не подходят и смысла не имеют.

Терапия

Локальный контроль за опухолью в рамках терапии, сохраняющей грудь, облучение остальной части молочной железы. Системная терапия или предупреждение распространения опухолевых клеток посредством химио-, гормональной терапии или терапии антителами. Решения по поводу видов лечения , которые должны будут применяться в каждом конкретном случае, могут быть приняты только в контексте всех знаний относительно обстоятельств и результатов исследований (биологических свойств опухоли), а также с согласия пациентки.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.
Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de
© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH