Дисфагия

Расстройство акта глотания — нарушение приема, подготовки и транспортировки пищи из ротовой полости в желудок.

Расстройство акта глотания может возникнуть временно при воспалении миндалин или же длиться какое-то время при некоторых неврологических заболеваниях.

Возникновение

Расстройство акта глотания может быть следствием заболеваний мозга, нервов, ротовой полости, гортани, зева или пищевода. Нарушенный прием пищи может привести к неполноценному питанию, а может представлять опасность и для лёгких в случае частых захлёбываний.

Профилактика

Регулярные профилактические обследования могут помочь своевременно выявить признаки возникновения болезни.

Симптомы

Расстройство акта глотания может выражаться по-разному. В принципе это касается всех выше перечисленных органов и фаз акта глотания или может возникнуть только при различной консистенции пищи. Нежелательное снижение веса и частое глотание являются важными симптомами расстройства акта глотания, к которым нужно отнестись серьёзно. Нарушение говорения указывает на то, что для подготовки и транспортировки пищи в ротовой полости могут иметься препятствия.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.
Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH

Диагностика

Диагностика представляет собой обследование всех органов, которые необходимы для процесса глотания, и их функций.

Терапия

Лечение назначается индивидуально в зависимости от вида и степени расстройства. При продолжительных нарушениях в курс лечения часто входит лечебная гимнастика.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.
Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de
© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH