



## Рак поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы в принципе может возникнуть в любой части органа. На сегодняшний день чаще всего поражается головка.

Многие формы рака поджелудочной железы возникают из различных типов тканей. Более 95% рака поджелудочной железы возникают путем злокачественного преобразования клеток, выстилающих мелкие выходные протоки той части железы, которая производит секрет (протоковые экзокринные опухоли).

Среди них чаще всего встречаются так называемые аденокарциномы. Они составляют около 80-90% всех раковых заболеваний железы.

Реже встречаются цистаденокарциномы, которые также возникают из протоковых клеток (примерно 6% всех карцином поджелудочной железы) и ацинарные опухоли, исходящие из ацинуса, т.е. конечных отделов протоковой системы поджелудочной железы, производящих ферменты.

Так называемые эндокринные опухоли составляют около 5% раковых заболеваний поджелудочной железы. Они могут возникать из гормонпродуцирующих клеток островков Лангерганса, располагающихся разбросанно в ткани железы.

---

*Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.*

*Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.*

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) [patient@dk-allianz.de](mailto:patient@dk-allianz.de)

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH