



Диагностика

Диагноз подтверждают пальцевое ректальное ощупывание и проктоскопическое исследование анального канала.

С помощью трансперинеальной (через промежность) доплерсонографии можно определить повышенный локальный кровоток к геморроидальному сплетению.

При ректальном кровотечении, несмотря на известное наличие геморроя, всегда необходимо проводить высокую колоноскопию для исключения источников кровотечения, расположенных в проксимальных отделах кишечника!

Также перед началом лечения в рамках дифференциального диагноза необходимо исключить следующую колопроктологическую патологию:

- Перианальный тромбоз
- Анальная трещина
- Анальная фистула
- Кондиломы
- Гипертрофический анальный сосочек
- Анальная экзема
- Мариски
- Фиброма анальной области

Дифференциальный диагноз с онкологическими заболеваниями прямой кишки и ануса

- Колоректальный рак
- Анальный рак
- Рак анального канала
- Рак у края анального отверстия

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



- Аноректальная меланома

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH