



Симптомы

Большинство опухолей молочной железы (примерно половина) встречаются у женщин в верхней наружной области, около 15 % в верхней внутренней области. При этом левая молочная железа поражается чаще, чем правая. В начальной стадии, как правило, рак груди не вызывает никаких болей или других жалоб. Тем внимательнее должны относиться женщины к определённым признакам, которые могут указывать на возможный рак. При уже далеко зашедшем заболевании могут встречаться симптомы, которые вызывают метастазы, например, боли в костях, затруднение дыхания или потеря веса.

Уплотнения в молочной железе

Узлы могут пальпироваться лишь с величины примерно 1-2 см – в зависимости от их расположения (непосредственно под кожей или глубже), от плотности железы (узловатая или не узловатая) и от величины молочной желёз. Они не поддаются смещению, твёрдые на ощупь и, как правило, безболезненны.

Изменения в области соска

Впервые появившиеся локальные втяжения или втяжение всего соска также являются тревожным сигналом наряду с воспалением и изменениями кожи или выделениями из соска, особенно, если они кровянистые или прозрачные и наблюдаются только с одной стороны.

Изменения величины молочной железы

У большинства женщин молочные железы различны по величине. Если всё-таки разница в величине появилась впервые и, если кожа в каком либо месте втянута, это является основанием обратиться к врачу. Также различное положение молочных желёз при поднятых вверх руках должно быть уточнено в ходе обследования.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



Особенности кожного покрова

Втяжения кожи и другие подозрительные изменения кожи (крупнопористость, «апельсиновая корка») являются возможными признаками рака молочной железы, так же как и не проходящие покраснения и воспаления.

Опухание в области подмышечной впадины

Обнаружение опухания и уплотнений в области подмышечной впадины могут свидетельствовать о метастазах в лимфоузлы.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH