Хирургия грыжи дисков шейного отдела

В большинстве случаев доступ к позвоночнику производится через маленький разрез вдоль кожной складки с боковой стороны передней поверхности шеи. Как правило, этот разрез делается с правой стороны шеи, также в случае беспокойств в левой руке.

Выступающие фрагменты межпозвоночного диска, которые явились причиной раздражения нервного корешка, удаляются под микроскопом. Заблокирование обоих тел позвонков, непосредственно граничащих с удалённым диском, можно иногда избежать путём имплантации межпозвонкового протезного диска.

С случае, если зажат спинной мозг, как правило, после удаления диска блокировка необходима. С помощью этих методик спинной мозг после его освобождения от зажатия может легче восстановиться, т.к. позвоночник в области повреждения будет находиться в состоянии покоя. Место удалённого диска замещается маленькой заглушкой, заполненной костной тканью (так наз. «Cage»). Функция позвоночника через предпринятую блокировку не нарушается, общая подвижность остаётся сохранной.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.
Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de
© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH