



Рефлюкс (эзофагит)

Более 30% населения страдает хотя бы раз в месяц от проявлений желудочного рефлюкса (изжога, отрыжка кислотой и воздухом, нарушение глотания, воспаления гортани и бронхов).

Возникновение

Из-за неполного закрытия пищеводно – желудочного жома (грыжа пищеводного отдела диафрагмы) кислое желудочное содержимое попадает в пищевод (избыточный вес, неправильное питание). Приём определенных медикаментов может также вызывать недостаточное закрытие жома. В результате могут возникнуть воспаления, сужения (стенозы), кровотечения, нарушения акта глотания и даже злокачественные опухоли.

Профилактика

Избегать употребления крепкого алкоголя, курения.
Продуманное питание, употребление пищи, богатой клетчаткой.

Симптомы

Изжога, отрыжка воздухом, нарушение акта глотания, рвота, в том числе и кровавая, потеря веса.

Диагностика

Эндоскопическое обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, так называемая эзофагогастродуоденоскопия или ЭГД. Измерение уровня кислотности пищеводно-желудочного отдела.

*Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.
Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.*

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



Терапия

Медикаментозное лечение препаратами, снижающими кислотность желудка (ингибиторами протонной помпы). Сон в полусидячем положении. Расширение пищевода (бужирование). Остановка кровотечений с помощью лазера, оперативное лечение по показаниям.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH