



Симптомы

Симптоматика геморроя весьма разнообразна и зачастую не очень чёткая. Характерные для геморроя симптомы могут указывать и на другие, нередко серьёзные заболевания и поэтому при их возникновении обязательно нужно своевременно обследоваться у врача. Однако у многих людей геморрой протекает вообще без симптомов. Особенно это отмечается при геморрое 1-й степени.

Симптомы при геморрое первой степени – геморрой первой степени большей частью протекает бессимптомно, и пациенты, как правило, не замечают лёгкого набухания сосудистого сплетения. В редких случаях может ощущаться слабый зуд или незначительное жжение. В кале иногда могут обнаруживаться следы алой крови. В большинстве случаев геморроидальные узлы не выступают из анального отверстия, так как они набухают не очень сильно и находятся не у самого края анального отверстия. В зависимости от причин может оказаться достаточным изменить диету и чаще заниматься спортом, чтобы быстро избавиться от внутреннего геморроя.

Симптомы при геморрое второй степени — в этой стадии зуд в анальном отверстии усиливается, и в этом случае говорят об анальном зуде. Этот зуд часто сопровождается болью и большинством пациентов считается одним из самых худших и мучительных симптомов геморроя. После натуживания можно прощупать первые узлы, которые иногда могут выступать при дефекации, однако после этого самостоятельно втягиваются назад. Кровотечения при опорожнении усиливаются. В кале или на туалетной бумаге может обнаруживаться большее количество алой крови. Может случаться и так, что кровь продолжает капать в унитаз и после дефекации.. Впервые появляется ощущение запора.. Оно вызывается усиленно набухающими на данной стадии сосудистыми сплетениями. При этой степени справиться с зудом и болями может помочь консервативное лечение и использование мазей и домашних средств, что также способствует избавлению от геморроя.

Симптомы при геморрое третьей степени – в дополнение к симптомам первой и второй степени в стуле могут обнаруживаться слизистые выделения, которые вызываются сильно

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



набухшими сосудистыми сплетениями. Смыкание заднепроходного отверстия уже не контролируется полностью, и при спонтанном кашле или чихании может произойти непроизвольное выделение кала. В медицинской терминологии это состояние также называют недержанием.

Геморроидальные узлы во время или после дефекации могут выступать из анального отверстия и при этом самостоятельно уже не втягиваются обратно. Их приходится вправлять «вручную». Ощущение неполного опорожнения усиливается, что у многих пациентов создаёт «порочный круг», поскольку они очень часто посещают туалет, а сосудистые сплетения из-за натуживания набухают ещё сильнее. В повседневной жизни больные геморроем люди часто испытывают боли и назойливый зуд в области таза.

Симптомы при геморрое четвёртой степени – наряду с симптоматикой, характерной для геморроя предыдущих стадий, может случиться так, что геморроидальные узлы выступают из анального отверстия не только при дефекации, но и в другое время. В целом вернуть их обратно в анальное отверстие можно лишь на фоне сильной боли.

Ощущение неполного опорожнения становится настолько сильным, что возникает чувство инородного тела в прямой кишке. Из-за сильного набухания сосудистого сплетения здесь могут накапливаться бактерии, и формироваться язвы и экземы. При четвёртой стадии болезни могут проявляться также психические заболевания, такие как депрессия или психологический дискомфорт. В большинстве случаев геморроидальные узлы можно удалить путём операции или амбулаторного хирургического вмешательства, например, путём склерозирования.

Всегда помните, что похожая симптоматика может указывать и на другие кишечные заболевания. Если в кале наблюдается не алая, а тёмная кровь, это означает, что она находилась в пищеварительном тракте уже длительное время и подвергалась воздействию желудочного сока. В таком случае Вам следует без промедления обратиться к врачу и пройти обследование.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH