



Причины и факторы риска

Причины развития рака почек до сих пор однозначно не объяснены. Но известны определенные факторы, повышающие риск возникновения заболевания. Следующие факторы повышают риск рака почек.

Фактор риска: курение

Никотин считается фактором риска возникновения рака почек. Риск ракового заболевания возрастает вместе с возрастающим количеством выкуриваемых в день сигарет и с возрастающей длительностью периода курения. Чем раньше в своей жизни человек начал курить, тем выше у него риск в поздние годы заболеть карциномой почек. Бросить курить имеет смысл в любое время для значительного снижения риска рака. Задумайтесь о том, что курение повышает риск не только рака почек. От 25 до 30% всех видов рака, прежде всего, рак легких, объясняется курением.

Фактор риска: медикаменты

Регулярный прием определенных обезболивающих медикаментов, прежде всего, содержащих фенацетин, ведет к повреждению почек, и представляется, что он способствует возникновению карциномы почек.

Фактор риска: генетические факторы

Так же наследственные факторы могут играть роль в возникновении рака почек. Примерно у одного из 100 пациентов имеется генетическая предрасположенность к развитию этого вида рака. Предрасположенность может наследоваться в семейном кругу. Исследования показали: люди с определенным изменением в наследственном материале имеют повышенный риск заболеть раком почек. Подобные генетические изменения регулярно наблюдались при болезни Хиппеля-Линдау – редком наследственном заболевании, сопровождающемся

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



опухолями в различных органах. Люди, страдающие этим наследственным заболеванием, заболевают в 28-45% случаев также почечно-клеточной карциномой. Повышенный риск рака почек имеют люди, больные туберозным склерозом. Речь идет о редком наследственном заболевании, приводящем уже в детском возрасте к опухолеподобным изменениям органов.

Фактор риска: медицинские факторы

Люди, страдающие хронической почечной недостаточностью (потеря функции почек), имеют повышенный риск заболевания. Избыточный вес, особенно у женщин, является фактором риска карциномы почек. Возможно, при этом играют роль гормональные факторы.

Фактор риска: профессия

Представляется, что определенные группы профессий подвергаются повышенному риску рака почек. Сюда входят работники, имеющие преимущественно контакт с асбестом, кадмием, растворителями для химической чистки, а также с топливом и другими нефтепродуктами. Речь идет о веществах, получающихся, прежде всего, при металлообработке и производстве кокса и угольного газа.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH