



Сужение слёзного канала

У маленьких детей часто наблюдается слёзотечение и воспаление глаз в первые недели и месяцы жизни.

Обычно, в здоровом состоянии, слеза стекает через два маленьких отверстия в нижнем и верхнем крае века (нижняя и верхняя слёзные точки) в слёзные каналы и далее в нос и глотку.

Возникновение

Носослёзный канал, который естественным образом должен открыться у новорождённого, остаётся в некоторых случаях закрытым в течение первых недель и месяцев жизни. Слез застывает, и глаз начинает слезиться и воспаляется.

Профилактика

Каждый раз, пеленая ребёнка, Вы должны снаружи массировать носослёзный канал. Положите указательный палец сбоку на носик ребёнка и, слегка надавливая, массируйте подушечкой пальца по направлению вверх ко внутреннему уголку глаза.

Иногда непроходимость носослёзного канала приводит к инфекциям и хроническим воспалениям глаза. В этом случае возникает необходимость лечения глазными каплями, содержащими антибиотик или, соответственно, снимающими отёк. Эти глазные капли Вы должны закапывать ребёнку в нижний конъюнктивальный мешок неоднократно в течение дня, точно следуя указаниям Вашего врача-офтальмолога. Эта процедура проводится непосредственно после вышеописанного массажа носослёзного канала пальцем.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



Симптомы

Слезящийся и/или воспалённый один глаз или оба.

Терапия

В редких случаях носослёзный канал не открывается сам по себе в течение первых 12 месяцев жизни ребёнка. Если по истечении первого года жизни проходимость слёзных путей не восстанавливается, врачом-офтальмологом производится попытка промывания и зондирования носослёзного канала ребёнка под кратковременным наркозом.

Эти мероприятия не проводятся до года жизни ребёнка по следующим причинам:

1. носослёзный канал, как правило, сам открывается за это время;
2. риск повреждения слизистой оболочки носослёзного канала во время оперативного вмешательства (зондирование и промывание) в возрасте после 1 года значительно ниже.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH