



Симптомы

Как правило, быстро растущие карциномы верхних дыхательных и пищеварительных путей, в зависимости от расположения, дают индивидуально различную по выраженности симптоматику.

Полость рта и глотка

Карциномы в области языка очень часто причиняют боль, однако могут также проявляться лишь чувством жжения, образованием язв или видимым отёком.

- Карциномы в области дна полости рта или карциномы в области нижней челюсти могут, кроме вышеуказанных симптомов, к тому же вызывать проблемы при ношении зубных протезов.
- Опухоли, расположенные в глотке, часто вызывают затруднения при глотании или чувство инородного тела. Кроме того, они могут проявляться повторяющимися кровотечениями — это относится прежде всего к большим опухолям. Часто к этому моменту опухоль уже образует метастазы в шейные лимфоузлы. При этом треть пациентов обращается к врачу в связи с неясной припухлостью в области мягких тканей шеи.
- Непонятные боли в горле и в ухе, без видимой патологии в ушах, могут быть вызваны глубоко расположенной карциномой глотки.

В дальнейшем раковое заболевание в области верхних дыхательных и пищеварительных путей может привести к потере веса и к опухоли в области шеи.

Гортань

Карциномы гортани на основе вышеназванных анатомических областей подразделяются на связочные, надсвязочные и подсвязочные.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



- Типичным для карциномы в области голосовых связок является стойкая осиплость голоса. Могут присоединяться першение в горле, потребность «*прочистить горло*» и хронический кашель. В далеко зашедших стадиях больные страдают дыхательным расстройством с шумным дыханием и даже с чувством нехватки воздуха.
- В противоположность этому, пациенты с надсвязочной карциномой жалуются на непонятные расстройства глотания, боли (иногда отдающие в ухо) и неясное чувство инородного тела в горле.
- Подсвязочные карциномы часто в течение длительного времени остаются незамеченными до тех пор пока в связи с их ростом не появятся нарушения дыхания или в связи с прорастанием в голосовые связки не появится осиплость голоса.

Карциномы в области голосовых связок часто могут быть вовремя замечены, т. к. уже маленькие карциномы в этой области приводят к стойкой осиплости голоса. Поэтому причина осиплости голоса, продолжающаяся более 2 — 3 недель, должна быть выяснена путём обследования у ЛОР-врача. Как и при всех раковых заболеваниях имеет значение тот факт, что большинство рано обнаруженных опухолей поддаются излечиванию — особенно если они ещё не распространились в региональные лимфоузлы.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH