



Нарушения эрекции (эректильная дисфункция), импотенция

Каждый пятый мужчина может столкнуться с этими явлениями, а в возрастной группе между 40 и 70 годами жизни больше половины мужчин испытывают проблемы, связанные с эрекцией. Не каждый готов выяснять для себя причины, по которым ставится диагноз : «Импотенция» (медицинское название: «эректильная дисфункция»), хотя возможности диагностики и лечения в последние годы сильно улучшились.

Каждый мужчина переживает в своей жизни один или несколько эпизодов отсутствия эрекции или, как минимум, страха перед такой ситуацией, но о симптомах заболевания можно говорить только в том случае, если в течение длительного времени (больше 6 месяцев) наблюдалось отсутствие возникновения и поддержания достаточной эрекции для удовлетворительного полового акта.

Вопреки утверждениям средств массовой информации можно быть уверенным: с возрастом потенция ослабляется, но не исчезает.

Эрекция (отверждение мужского полового члена) – это своеобразное взаимодействие многих факторов, например, сексуальных фантазий, эротических раздражителей и прикосновений, которые приводят к стимуляции нервных клеток и, под влиянием импульсов к наполнению кровью полостей пещеристых тел, усиленному кровообращению и к замедлению оттока крови по венам. В случае нарушения взаимодействия притока артериальной крови, расширения пещеристых тел и оттока крови по венам, наблюдается, как следствие, нежелательное нарушение отверждения полового члена. Когда различные функции органов должны соответствовать друг другу в тончайшей временной последовательности, дефекты и расстройства неминуемы.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



Возникновение

Большое число возможных причин может привести к нарушению эрекции. Ими могут быть органические факторы, такие как сосудистые изменения, повреждения нервных клеток, заболевания половых органов или гормональные нарушения, но и препараты для понижения артериального давления и психотропные лекарственные средства, алкоголь и никотин могут оказывать негативное воздействие на эрекцию.

Симптомы

В течение длительного времени (больше 6 месяцев) наблюдается отсутствие возникновения и поддержания достаточной эрекции для удовлетворительного полового акта.

Диагностика

Для систематизации факторов пациент получает опросную анкету. Это сотрудничество с пациентом позволяет врачу – специалисту распознать и классифицировать негативные факторы. Затем совместно обсуждаются возможные причины эректильной дисфункции, подпадающие в одну из трёх категорий.

Только у около 5% пациентов выявляются дефициты на гормональном уровне (при образовании и действии гормонов). 25% имеют психогенные (психологические) или невротические причины расстройств, а у всех остальных наблюдаются нарушения или поражения сосудистой системы.

Наша анкета даёт возможность понять, где коренятся проблемы. В разговоре с врачом обсуждаются конкретные проявления расстройства: недостаточность отвердения члена (ригидность) или невозможность увеличения объёма (тумесценция)? Или недостаточная продолжительность ригидности? Обсуждение других заболеваний и перенесённых операций имеет также большое значение при опросе.

Для выявления причины нарушения потенции проводится общий физический осмотр пациента. Специальные диагностические мероприятия должны показать степень притока крови в пенис и её оттока, а также способность к расширению пещеристых тел. Тонкой иглой

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



(микроигла типа „укус комара“) вводится специальный медикамент в области корня пениса. После этого возможно определение тока крови, а также его безболезненное измерение посредством ультразвуковой эхографии (цветная ультразвуковая доплерография). В редких случаях показано рентгеновское обследование.

Терапия

Существует широкий спектр возможностей лечения, от медикаментозного до оперативного, который используется в зависимости от причин заболевания. Большая часть мужчин обходится таблетками в качестве временной или длительной поддержки. Другие обучаются способу делать самому себе инъекции, а третьи с успехом пользуются вакуумной помпой. В зависимости от причины эректильной дисфункции и исходя из индивидуальной оценки пациента, можно добиться высокой степени удовлетворённости, в том числе и у партнёров.

Предпосылкой для такой терапии является преодоление пациентом «порога стыдливости, неловкости». Мужчина, столкнувшийся с этой проблемой, должен быть готов говорить об этом и в деталях описать картину своих жалоб. Сдержанность и такт являются само собой разумеющимися правилами работы врача. окончательный диагноз. И тогда, вопреки бытующему мнению: «Теперь уж всё равно всё поздно!», можно, благодаря надлежащей диагностике, провести своевременное, щадящее и – часто – сохраняющее орган лечение, которое с большой вероятностью гарантирует выздоровление.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH