



## Симптомы

Типичных симптомов, указывающих на ранних стадиях на злокачественную опухоль простаты, нет. Вначале пациенты ничего не замечают. Жалобы появляются в основном тогда, когда опухоль становится настолько большой, что поражает мочеиспускательный канал, проходящий через простату несколько дальше, или дочерние опухоли (метастазы) образуются за пределами простаты, например в лимфоузлах и костях.

### Могут возникнуть следующие симптомы:

- Учащенные позывы к мочеиспусканию, особенно ночью
- Затруднения при начале мочеиспускания
- Невозможность мочиться (задержка мочи)
- Слабая или прерывистая струя
- Болезненная эякуляция
- Кровь в моче или семенной жидкости
- Боли в простате
- Сильные боли в нижней части спины (область крестца), тазу, тазобедренных суставов, бедер (ишиас боли)
- Снижение силы эрекции или импотенция.
- Сниженное количество семенной жидкости

Часто такие же симптомы являются признаками доброкачественного увеличения простаты. Но примерно в 10% случаев за ними стоит раковое заболевание простаты. Лечение рака простаты в Германии, выявленного на ранней стадии развития, является наиболее эффективным.

---

*Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.*

*Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.*

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) [patient@dk-allianz.de](mailto:patient@dk-allianz.de)

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH